피임제 허가현황(5월 20일 기준)

번호	전문/일반	제품명	제약사명	사전/응급
1	일반	쎄스콘정	크라운제약	사전
2	일반	에이리스정	한국화이자제약	사전
3	일반	미니보라30	동아제약	사전
4	일반	트리퀼라정	동아제약	사전
5	일반	라니아정	현대약품	사전
6	일반	미뉴렛정	한국화이자제약	사전
7	일반	마이보라정	동아제약	사전
8	일반	멜리안정	동아제약	사전
9	일반	센스리베정	광동제약	사전
10	일반	디어미정	녹십자	사전
11	일반	머시론정	바이엘코리아	사전
12	일반	디안나정	다림바이오텍	사전
13	전문	야스민정	바이엘코리아	사전
14	전문	야즈정	바이엘코리아	사전
15	전문	클래라정	바이엘코리아	사전
16	전문	노레보정(레보노르게스트렐)	현대약품	응급
17	전문	쎄스콘원앤원정(레보노르게스트렐)	크라운제약	응급
18	전문	레보니아정(레보노르게스트렐)	명문제약	응급
19	전문	레보노민정(레보노르게스트렐)	신풍제약	응급
20	전문	엠에스필정(레보노르게스트렐)	태극제약	응급
21	전문	포스티노-1정(레보노르게스트렐)	지아이메딕스	응급
22	전문	노레보원정(레보노르게스트렐)	현대약품	응급
23	전문	세이프원정(레보노르게스트렐)	광동제약	응급
24	전문	엔티핌정(레보노르게스트렐)	진양제약	응급
25	전문	레보니아원정(레보노르게스트렐)	명문제약	응급
26	전문	애프터원정(레보노르게스트렐)	다림바이오텍	응급
27	전문	엘라원정(울리프리스탈 아세테이트)	현대약품(주)	응급
28	전문	세이프원플러스정(레보노르게스트렐)	광동제약(주)	응급

피임제 안전사용 지원 정책 확대 추진(안)

세부 추진 정책	주관부처	일정
○ 피임제 안전사용 지원확대(사용단계) - (의사용) 상담매뉴얼, 사용여성 자가체크리스트 마련·배포 - (약사용) 복약지도 매뉴얼, 사용여성 체크리스트 마련·배포 - (소비자용) 복약안내서, 성분별 복약설명서 마련·배포	식약처	'16.5월~
○ 피임제 정보제공 홈페이지 개설 - 피임, 피임제 종합정보 제공	식약처	'16.10월~
○ 맞춤형 피임·피임제 교재 보급 - 시각/청각장애인 동영상 교재 포함	식약처	'16.5월~
○ 모든 초·중·고등학교 학년별 성교육(피임교육 포함) 실시 - 학교 교육과정과 연계 추진	교육부	연중
○ 피임제 대중광고시 그 내용에 복용법, 부작용, 여성의 선택권 등 공익성 강화 ※ 사례	식약처	'16.12월

현행		현행	개선 후
형식		문자	음성 및 문자(동시 표시)
내용	복용법	-	21일 복용후 7일간 복용을 하지 않습니다.
	부작용	-	두통이나 메스꺼움 등 부작용이 있습니다.
	여성의 선택권	-	피임약은 여성이 선택할 수 있는 피임 방법 중의 하나입니다.
	의료전문가와 상담	의사·약사와 상의하십시오. 장기 사용할 경우 주기적으로 병의원 진료를 받으시기 바랍니다.	의사·약사와 상의하십시오. 장기 사용할 경우 주기적으로 병의원 진료를 받으시기 바랍니다.

○ 성폭력상담소, 청소년상담기관 등에서 응급피임제 필요시, 연계된 의료기관 또는 응급실을 통한 진료 · 투약 안내	여성가족부	연중
○ 야간진료 의료기관이나 응급실에 심야(22시~익일 06시)나 휴일 당일분에 한해 원내조제 허용(계속)	보건복지부	연중
○ 피임제 부작용 발생 집중 모니터링 실시	식약처	연중
○ 인터넷 불법판매 상시 단속 및 조치	식약처	연중
○ 성별, 계층별 피임지식 조사 실시(연도별 평가 실시)	식약처	'16.11월
○ 피임제의 안전성 입증자료 연구·수집·평가(품목갱신)	식약처	5년 주기

피임제 안전사용 지원 정책 추진 현황 비교표

<table>
<tr><th>구분</th><th>추진현황('13～'15)</th><th></th><th>추진 계획('16년～)</th><th>주관</th></tr>
<tr><td rowspan="2">피임제 안전사용 교육·홍보 및 성·건강·피임 교육 실시</td><td><신규>
<신규>
<신규>
○ (소비자용) 약국구매시 복약설명서 마련·배포('13년～)
* 전국 약국에 총 1,421,600부 배포</td><td>⇨</td><td>○ (의사용) 상담매뉴얼, 사용여성 체크리스트 마련·배포('16.5～)
○ (약사용) 복약지도 매뉴얼, 사용여성 체크리스트 마련·배포('16.5～)
○ 피임제 정보제공 홈페이지 개설('16.10～)
- 피임, 피임제 종합정보 제공
○ 맞춤형 피임·피임제 교재 보급('16.5～)
-시각/청각장애인 동영상 교재 포함
<지속 추진></td><td>식약처
식약처
식약처
식약처</td></tr>
<tr><td>○ 모든 초·중고등학교 학년별 성교육(피임교육 포함) 실시</td><td><지속 추진></td><td>교육부</td></tr>
<tr><td>광고·표시</td><td>○ 피임제 대중광고시 의료전문가 상담 문구 추가('13.3월～, 42건 심의반영)
<table><tr><th colspan="2">구분</th><th>현행</th></tr><tr><td rowspan="5">내용</td><td>의료전문가와 상담</td><td>의사·약사와 상의하십시오. 장기 사용할 경우 주기적으로 병의원 진료를 받으시기 바랍니다</td></tr><tr><td>복용법</td><td><신설></td></tr><tr><td>부작용</td><td><신설></td></tr><tr><td>여성의 선택권</td><td><신설></td></tr><tr><td colspan="2">형식</td><td>문자</td></tr></table></td><td></td><td>○ 대중광고시 그 내용에 복용법, 부작용, 여성의 선택권 등 공익성 강화
<table><tr><th colspan="2">구분</th><th>개선안</th></tr><tr><td rowspan="4">내용</td><td>의료전문가와 상담</td><td>(현행과 같음)</td></tr><tr><td>복용법</td><td>21일 복용후 7일간 복용하지 않습니다.</td></tr><tr><td>부작용</td><td>두통, 메스꺼움 등 부작용이 있습니다.</td></tr><tr><td>여성의 선택권</td><td>피임약은 여성이 선택할 수 있는 피임방법 중의 하나입니다.</td></tr><tr><td colspan="2">형식</td><td>문자 및 음성</td></tr></table></td><td>식약처</td></tr>
<tr><td>성폭력상담소 등 응급피임제 안내</td><td>○ 성폭력상담소, 청소년상담기관 등에서 응급피임제 필요시, 연계된 의료기관 또는 응급실을 통한 진료·투약 안내</td><td>⇨</td><td><지속 추진></td><td>여성가족부</td></tr>
<tr><td>응급피임약 원내조제 허용</td><td>야간진료 의료기관이나 응급실에 심야(22시~익일 06시)나 휴일 당일분에 한해 피임제 원내조제 허용</td><td>⇨</td><td><지속 추진></td><td>보건복지부</td></tr>
<tr><td>부작용 집중 모니터링</td><td>○ 피임제 부작용 발생 집중 모니터링 실시</td><td>⇨</td><td><지속 추진></td><td>식약처</td></tr>
<tr><td>불법판매 상시 단속</td><td>○ 인터넷 불법판매 상시 단속 및 조치 * 실적('13년이후 635건)</td><td>⇨</td><td><지속 추진></td><td>식약처</td></tr>
</table>