30개 임시마약류 지정-재지정예고 물질

연번	물질명	화학명칭	지정사유
1	RTI-111	methyl(1R,2S,3S,5S)-3-(3,4-dichlorophenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate	가. 기타 계열 나. 중추신경계 작용 다. 심박수 증가, 홍분, 기관지 확장, 체온 상승, 혈압상승, 다행감, 상습적 재사용, 불안, 우울, 의존성, 금단증상 등을 나타낼 수 있음 라. 정보없음 마. 일본(지정약물) 규제
2	5-MAPB	1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 위해사례 및 의존성 평가 보고 없음 라. 2013.3월 국제등기우편물을 통한 국내 반입 1건 확인(관세청) 마. 영국(phenethylamine analogue), 뉴질랜드(amphetamine analogue), 호주(alkoxyamphetamines) 해당
3	2,3-DCPP ※ 원소 또는 화합물에 화학반응을 일으키게 하는 용도로 사용되는 경우(의약품 합성 등)에는 임시마약류에 해당하지 않음	1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine	가. 피페라진 계열 나. 중추신경계 작용 다. 위해사례 및 의존성 평가 보고 없음 라. 정보 없음 마. 일본(지정약물) 규제
4	MDAI	6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 다른 약물과 함께 사용될 경우 신경독성을 유발할 수 있다는 보고가 있음 라. 2012.7월 국제등기우편물을 통한 국내 반입 확인(관세청) 마. 일본(지정약물) 규제, 뉴질랜드(amphetamine analogue)에 해당
5	25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)	2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)-methyl]ethanamine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 영국에서 7명 중독증상(환각, 발작, 간헐성 경련 등) 라. 정보 없음 마. 영국·일본 규제
6	2C-C-NBOMe	2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 위해사례 및 의존성 평가 보고 없음 라. 정보 없음 마. 영국·일본 규제
7	3-Fluoromethamphetamine (3-FMA)	1-(3-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 위해사례 및 의존성 평가 보고 없음 라. 정보 없음 마 일본 규제, 영국 (phenethylamine analogue)·뉴질랜드(amphetamine analogue) 해당
8	5-(2-Aminopropyl)indole (5-API, 5-IT)	2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 스웨덴 사망사건(14건) 보고 및 동공확장, 발한 등 중독 증상 라. 정보 없음 마. 영국일본 규제, 뉴질랜드(amphetamine analogue) 해당
9	5-IAI	5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. Rat에서 신경독성 유발 라. 정보 없음 마. 일본 규제
10	Dimethoxy-methamphetamine(DMMA)	2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylpropylamine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 위해사례 및 의존성 평가 보고 없음 라. 정보 없음 마. 독일 규제, 영국(phenethylamine analogue)·뉴질랜드(amphetamine analogue) 해당
11	DOC	1-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)propan-2-amine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 영국에서 DOC 복용이 원인으로 추정되는 백인 남성 사망 라. 정보 없음 마. 독일 규제, 영국 (phenethylamine analogue)·뉴질랜드(amphetamine analogue) 해당
12	Ethylphenidate	(RS)-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-yl acetate	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 메틸페니데이트의 50~80% 정도의 효능을 가지는 것으로 알려져 있고 남용 가능성이 있다는 보고가 있음 라. 정보 없음 마. 독일 규제
13	MT-45 (IC-6)	1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine	가. 피페라진 계열 나. 중추신경계 작용 다. 위해사례 및 의존성 평가 보고 없음 라. 정보 없음 마. 일본 규제
14	5-MeO-EPT	5-Methoxy-N-ethyl-N-propyltryptamine	가. 트립타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 위해사례 및 의존성 평가 보고 없음 라. 정보 없음 마. 일본 규제, 뉴질랜드 DMT analogue 해당
15	alkyl nitrite (poppers, rush, boppers, snappers) ※화학명칭에 기재된 7종에 대해서만 적용. 다만, 원소 또는 화합물에 화학반응을 일으키게 하는 용도로 사용되는 경우(학술연구 및 제품제조 등)에는 임시마약류에 해당하지 않음	isobutyl nitrite, isopropyl nitrite, pentyl nitrite, isopentyl nitrite, tertiarybutyl nitrite, cyclohexyl nitrite, butyl nitrite	가. 기타 나. 혈관 확장 다. 다른 혈관 확장제와 병용시 의식상실, 심장발작 등 유발 가능, 18개월 주기적 사용시 황반변성 발생 가능. 의존성 사례 보고, 급성독성(저혈압, 심부정맥) 및 만성독성(폐렴, 빈혈, 간독성 등) 유발 보고가 있음 라. 관세청, 경찰청 국내 유입 확인 사례 다수 마. 일본 일부 규제
16	A-836339	N-[3-(2-methoxyethyl	가. 합성대마 계열

연번	물질명	화학명칭	지정사유
		)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide	나. 중추신경계 작용 다. 정보 없음 라. 정보 없음 마. 일본, 호주(synthetic cannabinomimetics) 규제
17	p-Chloromethamphetamine	1-(4-chlorophenyl)-N-methylpropan-2-amine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 신경독성을 나타냄 라. 정보 없음 마. 영국(phenetyhlamine analogue),, 뉴질랜드(amphetamine analogue 해당) 규제
18	p-Bromoamphetamine	1-(4-bromophenyl)propan-2-amine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 랫드에서 신경독성이 보고됨 라. 정보 없음 마. 영국(phenethylamine analogue 해당), 뉴질랜드(amphetamine analogue 해당), 스위스 규제
19	25B-NBOMe	2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 뉴질랜드에서 해당물질 복용한 20대 남성이 신장 및 심장 부작용으로 응급 내원했다는 보도 있었음 라. 정보 없음 마. 미국, 영국(임시마약류), 스웨덴, 스위스 규제
20	25D-NBOMe	2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보 없음 라. 정보 없음 마. 영국(임시마약류), 스웨덴, 스위스 규제
21	25H-NBOMe	2-(2.5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 흥분제로서 중독 사고가 일어난 적이 있음(핀란드 마약류 지정 사유) 라. 정보 없음 마. 일본, 핀란드 규제
22	5-EAPB	1-(Benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 가능성(임시마약류 5-APB 유사구조) 다. 2013년 8월 영국에서 물질을 섭취한 30대 3명이 내원했고 그 중 한 명이 사망하는 사건이 발생했다는 보도 있었음 라. 정보 없음 마. 스위스 규제
23	2C-C	1-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-aminoethane	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 가능성(나목 향정 2C-I 유사구조) 다. 미국에서 22세 남성 및 17세 여성이 2C-C 복용 후 사망한 사건이 보도됨 라. 정보 없음 마. 미국, 독일, 일본 규제

연번	물질명	화학명칭	지정사유
24	2C-P	2-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)ethanamine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 가능성(나목 향정 2C-I 유사구조) 다. 환각, 환시 증상을 나타낸다는 자료가 있음 라. 정보 없음 마. 미국, 독일 규제
25	N-methyl-2-AI	2,3-dihydro-N-methyl-1H-inden-2-amine	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보 없음 라. 정보 없음 마. 일본 규제
26	3,4-dichloromethylphenidate	methyl (2R)-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetate	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 동물을 이용한 의존성 시험에서 메틸페니데이트보다 효능이 7배 높고 강화효과는 비교적 약했으며, 약물변별 시험에서는 코카인보다 중독성이 강할 수 있다는 보고 있음 라. 정보 없음 마. 스위스, 일본 규제
27	W-15	(E)-4-chloro-N-(1-phenethylpiperidin-2-ylidene)benzenesulfonamide	가. 기타 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보 없음 라. 정보 없음 마. 스위스 규제
28	RH-34	3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione	가. 기타 계열 나. 중추신경계 작용 다. 일부 복용자에게서 환각, 혈압상승, 두통, 호흡곤란 증세가 나타났다는 자료가 있음 라. 정보 없음 마. 스위스 규제
29	N-ethyl-norketamine	N-1-naphthalenyl-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide	가. 케타민 계열 나. 중추신경계 작용 가능성(나목 향정 ketamine 유사구조) 다. 환각 및 황홀감(euphoria)이 나타날 수 있으며 작용 시간이 짧아 남용 가능성이 있다는 자료가 있음 라. 2012년 초 인터넷을 통한 유통 보고됨 마. 스위스 규제
30	Lisdexamphetamine ※ 자가치료, 도핑검사의 용도로 식약처장의 승인을 받는 경우에는 임시마약류에 해당하지 않음	(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-phenylpropan-2-yl]hexanamide	가. amphetamine 계열 나. 체내에서 대사되어 중추신경계 작용 다. 아나필락시스, 환각 등 라. 미국 등에서 허가된 의약품의 국내 반입 사례 있음 마. 미국, 독일, 영국, 호주 규제